

ERYSIPELES

L'érysipèle est une infection bactérienne de la peau. Elle est beaucoup plus fréquente sur le ou les membres atteints de lymphœdème. Les signes cliniques de l'érysipèle sont : fièvre élevée (39-40°C), de survenue brutale, avec frissons, tremblements, puis rougeur, chaleur, augmentation de volume et du membre atteint.

Le traitement repose sur l'antibiothérapie per os par amoxicilline à raison de 50 mg/kg/j, jusqu'à 6 g/j maximum, en 3 prises ou pristinamycine à 3 g/j, pendant 7 jours. Les AINS sont contre-indiqués.



CE QUI EST RECOMMANDÉ

- En cas de plaie : lavage à l'eau et au savon, désinfection par antiseptique local, surveillance.
- Surveillance et traitement rapide des mycoses interdigitales.
- Avoir toujours le traitement sur soi.
- En cas de doute demander l'avis d'un médecin.
- En cas de 2 érysipèles dans l'année, une antibioprophylaxie est recommandée par pénicilline V, 1 MUI, 2 à 3 fois par jour selon le poids ou par benzathine benzyl pénicilline, 2,4 MUI toutes les 2 à 3 semaines, ou bien par azithromycine, 250 mg/j en cas d'allergie à la pénicilline.



CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- Prendre l'antibiotique sans signes clairs d'érysipèle.